

糖尿病で薬物療法（内服・注射薬）を受けている方が
低血糖昏睡になった場合の対処方法
（ご自身で対処できない場合）



低血糖昏睡とは・・・

糖尿病の薬物療法を受けている方がなんらかの原因で重症の低血糖をきたした場合、刺激にも反応がなく意識がない場合をいいます。最悪の場合、生命の危険があります

まず **低血糖を疑って、絶対に放置せず**速やかに対処してください

大声で呼びかけます

返事をしない

すぐに救急車（**119番通報**）を呼びます

- ①グルカゴン製剤が処方されていれば使用します
- ②救急車を待つ間に、ブドウ糖や砂糖、はちみつをくちびると歯茎の間に塗り付けます

※意識がもうろうとしている方に噛まれないように口腔内には指を入れないでください

※意識がもうろうとしている方に無理に飲ませると誤嚥の可能性があるので注意が必要です

病院に搬送してもらい適切な処置を受けましょう

再発防止のために

家族や友人、職場の人などに低血糖昏睡になったときの対処方法について頼んでおきましょう。繰り返す場合は、グルカゴン製剤が処方される場合もあります。主治医に相談してください。糖尿病カードを携帯しましょう。

わたしは糖尿病です。
I HAVE DIABETES

意識不明になったり、異常な行動が見られたら、私が携帯している砂糖（ブドウ糖）か砂糖水を飲ませてください。それでも回復しない時は、裏面して指示を受けてください。

わたしは糖尿病です。
I HAVE DIABETES

(1型糖尿病 Type 1 Diabetes)

意識不明になったり、異常な行動が見られたら、私が携帯している砂糖（ブドウ糖）、またはジュースか砂糖水を飲ませてください。それでも回復しない時は、裏面の医療機関に電話してください。